

► Cabinet Dentaire Concorde Rivoli Paris 1 er

Dr Ted LEVI - Dr Francisco JIMENEZ - Chirurgiens-dentistes à Paris 1 er

📍 242 rue de Rivoli 75001 Paris

☎ Tel. : +33 1 47 03 00 07

🌐 dr-levi-ted.chirurgiens-dentistes.fr

Les prothèses amovibles complètes

Les prothèses amovibles complètes permettent de remplacer l'ensemble des dents sur une ou les deux mâchoires. Elles peuvent être insérées et enlevées à volonté.

TYPES DE PROTHÈSES

- > La prothèse amovible complète traditionnelle appuyée sur les gencives et os de la mâchoire.
- > La prothèse amovible complète stabilisée par sa fixation sur des implants prévus à cet effet.

La réalisation de prothèses amovibles complètes nécessite une succession d'étapes d'une grande précision. Deux empreintes ou plus sont nécessaires pour enregistrer de façon très précise la position de la gencive, de la langue, des lèvres et des joues.

La prothèse, en résine acrylique, sera ensuite réalisée par un prothésiste.



STABILISATION DES PROTHÈSES AMOVIBLES COMPLÈTES

Prothèse traditionnelle

L'adhésion de la prothèse s'effectue sur les tissus de la bouche par un effet naturel de « ventouse », complété éventuellement avec une colle ou une résine spécifique.

En cas de perte de stabilité, un « rebasage » permettra de combler les espaces libres entre la prothèse et la gencive.

Prothèse fixée sur implants

- > La prothèse est fixée avec un dispositif de 2 ou 4 implants.
- > La tenue de la prothèse est assurée à la fois par les tissus de la bouche et par les implants.
- > Les systèmes d'attachement aux implants peuvent être :
 - un dispositif de boutons-pressions clipsés directement sur les implants dentaires ;
 - ou une barre intermédiaire assurant la contention des piliers et la tenue de la prothèse.

Cette solution apporte au patient confort et fiabilité dans le dispositif, en particulier pour la mastication et l'élocution.

SUIVI ET ENTRETIEN DES PROTHÈSES COMPLÈTES

En fonction du type de prothèse, un certain nombre de réglages sont à prévoir.

En cas de douleur légère, appliquez un gel antalgique et antiseptique.

Si vous ressentez une douleur plus forte, prenez rendez-vous et portez l'appareil quelques heures avant la consultation afin de bien identifier l'endroit à retoucher.

À SAVOIR

Une période d'adaptation est nécessaire mais l'appareil s'ajustera complètement à votre bouche.

Les prothèses nécessitent des soins tout aussi minutieux que les dents naturelles.

Un contrôle régulier est indispensable pour vérifier l'état de vos gencives et l'adaptation de votre prothèse.